

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở Nam, Nữ, Miệng, Lưỡi

1. Sùi mào gà là bệnh gì?

Sùi mào gà (sui-mao-ga-o-nam-nu) là bệnh lây truyền qua đường tình dục, dẫn tới bởi virus virus sùi mào gà (HPV). Sùi mào gà là nguyên do dẫn tới các mô sùi hình bông cải hay mào gà tạo thành trên trên da hoặc niêm mạc miệng, vùng nhạy cảm cũng như ở vùng hậu môn của cả phụ nữ và đàn ông giới. Sùi mào gà có khả năng dẫn tới không thoải mái, ngứa cũng như đau, và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe tâm lý của người bệnh. [1]

Theo kết quả thống kê của Trung tâm

kiểm soát cũng như phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ), sùi mào gà ảnh hưởng đến khoảng 340.000 tới 360.000 người mỗi năm. Trong khi đấy, tình hình tại Việt Nam cũng không khả quan hơn lúc số ca mắc mới liên tục gia tăng đặc biệt là tại một số đô thị lớn. Bệnh có thể tạo ra tại mọi giới, nhất là các đối tượng mắc suy giảm hệ miễn dịch cũng như một số đối tượng có hoạt động tình dục.

Bệnh lý sùi mào gà có khả năng tạo ra tại cả đàn ông và phụ nữ, tuy nhiên thường dễ dàng nhận thấy hơn tại đàn ông. Sau đây là những khu vực thường gặp sùi mào gà:

- Ở vùng kín: Sùi mào gà thường tạo ra ở những vùng da cũng như niêm mạc tiếp xúc với viêm nhiễm trong quá trình quan hệ tình dục. vị trí chủ yếu nhất là quanh cũng như

trên vùng nhạy cảm ngoài, như âm đạo, lỗ tiểu, bao quy đầu, bộ phận sinh dục nam, bên trong ở hậu môn, và lỗ vùng hậu môn. Hơn nữa, vùng da nằm giữa âm đạo cũng như vùng hậu môn hoặc bìu dương vật và ở hậu môn cũng là một trong các khu vực tạo ra hay thấy của sùi mào gà.

- Da quanh ở vùng sinh dục: bên ngoài các khu vực trên, sùi mào gà còn có thể phát triển trên những ở vùng da liền kề, như đùi, hông và vùng bụng dưới.
- Miệng cũng như họng: nếu như có tiếp xúc với virus HPV qua hoạt động tình dục miệng, sùi mào gà có thể xuất hiện ở miệng, môi, lưỡi, nướu, cũng như họng.

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn

đầu ở Nam, Nữ, Miệng, Lưỡi



Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở Nam, Nữ, Miệng, Lưỡi, Thuốc điều trị Sùi Mào Gà Podophyllin 25 tại nhà



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua ở nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật thông tin tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên đưa ra lời khuyên tư vấn nhiệt tình đến khi khỏi hẳn.

1.1. Sùi mào gà lây qua đường nào?

Sùi mào gà có thể lây truyền thông qua nhiều đường cũng như hình thức khác nhau, bao gồm:

- Quan hệ tình dục: giao hợp quan hệ bằng đường hậu môn hay miệng là con đường truyền nhiễm phổ biến nhất của sùi mào gà, kể cả việc đời sống chăn gối qua tại vùng hậu môn hay bằng đường miệng.
- Tiếp xúc trực tiếp: Sùi mào gà cũng có thể lan truyền lúc tiếp xúc với da hoặc niêm mạc tại vùng nhạy cảm của người bị nhiễm bệnh, ngay cả lúc không phải giao hợp.
- Sử dụng chung đồ dùng cá nhân: Việc chia sẻ các vật dụng cá nhân như khăn tắm, quần áo, đồ lót, bàn chải đánh răng, dụng cụ ăn uống,... khiến chúng bị tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh cũng có thể là một nguy cơ truyền nhiễm cần chú ý.
- Sinh hoạt tại các nơi có nguy cơ lây truyền cao: dùng chung một số dụng cụ làm đẹp (bấm móng tay,

dao cạo, kéo, sơn móng tay,...), massage (khăn, giường, một số dụng cụ massage,...) hoặc những dịch vụ tiếp xúc da kề da của người nhiễm cũng có thể là nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm sùi mào gà.

- Lây nhiễm từ người mẹ sang con: Trong các hiện tượng ít thấy, sùi mào gà có khả năng lây truyền từ người mẹ bị nhiễm sang con trong quá trình sinh nở.

1.2. Bệnh lý sùi mào gà có nghiêm trọng đến tính mạng không?

KHÔNG. Bệnh lý sùi mào gà không dẫn tới nghiêm trọng tới tính mạng, bệnh thường dẫn tới các đốm nâu hồng hình búi nhọn hay đầu sùi mào gà trên bộ phận sinh dục, âm đạo, dương vật, hậu môn và ở vùng xung quanh miệng. tuy

vậy, bệnh có khả năng ảnh hưởng nguy hiểm tới chất lượng đời sống của người bệnh như:

- Đau đớn, ngứa và chảy máu: một số mụn sùi mào gà có khả năng dẫn tới đau, ngứa, hoặc ra máu lúc quan hệ tình dục hoặc đi vệ sinh.
- Tăng tỉ lệ mắc ung thư: những chủng HPV gây ra sùi mào gà có thể liên quan tới nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung, âm đạo, bộ phận sinh dục nam hoặc tại vùng hậu môn.
- Ảnh hưởng tới sinh sản: Bệnh có thể dẫn đến ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của nữ giới, nhất là với một số đối tượng nữ giới có tổn thương ở cổ tử cung.
- Hậu quả đến sự tự tin, sức khỏe tâm lý: Bệnh sùi mào gà có khả

năng dẫn đến cảm giác bất tiện, mất tự tin và hậu quả đến mối quan hệ tình dục của bệnh nhân.

2. Hình ảnh sùi mào gà

2.1. Hình ảnh sùi mào gà ở nam

Bệnh sùi mào gà là một bệnh truyền nhiễm thông qua con đường dục tình điển hình tại cánh mày râu, có khả năng gây ra một số khó chịu, nhưng hiếm lúc gây ra những nguy hiểm đến tính mạng. một số triệu chứng của Bệnh sùi mào gà thường bao gồm những chấm đỏ hay sần sùi tạo ra trên đầu hay thân dương vật, bìu, các khu vực xung quanh, ở vùng hậu môn và đằng sau niêm mạc của bộ phận sinh dục nam. những nốt/ cụm sùi này có khả năng khiến người bệnh trần trở và cũng có khả năng mang đến các cơn ngứa cũng như đau rát cho một số quý ông.

Sự hình thành của sùi mào gà ở nam thường xảy ra trên một số tại vùng da dưới đây:

- Sùi mào gà hình thành trên niêm mạc sinh dục như ở vùng dương vật, lớp da bọc dương vật cũng như vị trí xung quanh.
- Các ở vùng da bất kỳ trên cơ thể như ngực, bụng, tay, chân và lưng.
- Khu vực ở vùng hậu môn và trực tràng, trên niêm mạc miệng, lưỡi cũng như họng, đặc biệt là ở những người có phát sinh quan hệ tình dục đồng tính nam thông qua con đường ở vùng hậu môn và miệng.



Có khoảng 90% phái mạnh bị Bệnh lý sùi mào gà do quan hệ ngoài luồng.

2.2. Hình ảnh sùi mào gà tại nữ

Sùi mào gà tại nữ giới thường bắt đầu bằng các đốm nhỏ có màu trắng hay hồng tạo ra trên các vùng kín của cơ thể như âm đạo, vùng nhạy cảm ngoài, tại vùng hậu môn cũng như vùng chậu. một

số đốm này sẽ dần phát triển thành một số cụm thịt lồi màu da, có con đường viền nổi rõ và thường dẫn đến ngứa, đau rát và vô cùng khó chịu. nếu như không thể nào chữa trị kịp thời, sùi mào gà ở nữ giới có khả năng tiến triển thành ung thư, phổ biến là ung thư cổ tử cung.

Sự tạo ra của sùi mào gà có khả năng xảy ra ở khá nhiều vị trí không giống nhau trên cơ thể của nữ giới, đặc biệt là ở vùng nhạy cảm. Dưới đây là các vị trí thường xảy ra của sùi mào gà ở nữ giới:

- Ở tại vùng kín: Sùi mào gà thường xuất hiện tại vùng nhạy cảm, bao gồm cả ở tại vùng âm đạo, hậu môn cũng như bên ngoài âm hộ.
- Ở vùng đùi: nếu virus HPV lây nhiễm vào lỗ âm đạo, có khả năng làm cho sùi mào gà tạo ra tại vùng tại xung quanh đùi.

- Cổ tử cung: tại các tình trạng nghiêm trọng hơn, sùi mào gà có khả năng lan rộng lên cổ tử cung của nữ giới.
- Ở vùng hậu môn: nếu như virus HPV truyền nhiễm vào con đường ở hậu môn, nó có khả năng gây ra sùi mào gà ở tại vùng này cũng như các vị trí xung quanh như phần da giữa ở hậu môn và cơ quan sinh dục.

Tuy nhiên, sự hình thành của sùi mào gà tại nữ giới có khả năng không giống nhau tùy vào từng trường hợp cụ thể. nếu nữ giới nghi ngờ mình có sùi mào gà tại bất kỳ vị trí nào, điều cần thiết là họ phải tìm kiếm sự chẩn đoán và trị liệu từ bác sĩ chuyên khoa phụ khoa để phòng ngừa bệnh lây lan cũng như tác động tới sức khỏe của mình.

Có khoảng 60% nữ giới bị Bệnh Lý sùi mào gà do quan hệ đồng giới.

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở Nam, Nữ, Miệng, Lưỡi



Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở

Nam, Nữ, Miệng, Lưỡi, Thuốc trị liệu Sùi Mào Gà Podophyllin 25 tại nhà



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật thông tin tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên giải đáp tư vấn nhiệt tình tới lúc khỏi hẳn.

2.3. Sùi mào gà cũng như mụn cóc sinh dục giống hoặc khác nhau?

Không giống nhau. Sùi mào gà và mụn cóc sinh dục là hai bệnh lý gây ra do Human Papillomavirus (HPV). Dù cả hai đều là kết quả của sự lây nhiễm HPV tuy nhiên chúng có các khác biệt quan trọng về dòng HPV gây ra những triệu chứng, triệu chứng lâm sàng, cũng như những nguy cơ liên quan.

Sùi mào gà và mụn cóc sinh dục đều chủ yếu gây ra bởi các chủng HPV nguy cơ thấp như HPV type 6 và HPV type 11. Chúng thường tạo ra trên nhô lên khỏi da ở vùng niêm mạc miệng cũng như sinh dục như bộ phận sinh dục nam, âm đạo, vùng hậu môn cũng như các tại vùng xung quanh. Cả sùi mào gà cũng như mụn cóc sinh dục thường không gây ra nguy cơ cao về ung thư, nhưng sẽ dẫn tới cảm giác không thoải mái và đau đớn cho người nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, về triệu chứng lâm sàng, sùi mào gà có hình dạng giống như những mảng gai nhỏ, chóp nhọn cũng như có thể phát triển thành các khối lớn như mào gà hay bông cải.. Trong khi đó, mụn cóc sinh dục có khả năng xuất hiện tại khá nhiều dạng hình và kích thước không giống nhau, từ mụn nhỏ phẳng chỉ có thể quan sát dễ thấy với kính hiển vi đến các gai nhô lên trên nhô lên khỏi da có thể nhìn thấy được.

Tóm lại, mụn cóc sinh dục và sùi mào gà đều do nhiễm virút HPV, tuy nhiên chúng có các tác nhân, biểu hiện, khu vực, cũng như phương pháp trị liệu khác nhau.

3. Các dấu hiệu sùi mào gà

3.1. Triệu chứng sùi mào gà ở nữ

Sùi mào gà là một căn bệnh truyền

nhiễm xã hội, do virút gây u nhú tại người (HPV) dẫn đến. biểu hiện sùi mào gà ở nữ có khả năng không giống nhau dựa theo trường hợp, Bên dưới là các triệu chứng thường gặp:

- Xuất hiện những nốt sùi: một số nốt sùi nhỏ mọc lên ở vùng kín hoặc xung quanh, thường có màu hồng hay da, hình thù giống như cụm sùi của bông cải hay mào gà. Nốt sùi có thể mọc riêng lẻ hoặc thành nhóm.
- Ngứa cũng như rất khó chịu: Nữ giới mắc sùi mào gà thường cảm thấy ngứa cũng như khó chịu ở vùng nhạy cảm, đặc biệt lúc các nốt sùi phát triển và lan rộng.
- Sưng và đau: lúc mắc nhiễm sùi mào gà, vùng kín có thể sưng đỏ cũng như đau nhức, gây ra phiền phức trong quá trình đi tiểu hay

chuyện ấy.

- Xảy ra chảy máu: những nốt sùi mào gà khi bị tổn thương có khả năng xuất huyết, đặc biệt sau lúc chuyện phòng the hay lúc vệ sinh vùng kín.
- Âm đạo tiết ra chất nhầy: Nữ giới bị nhiễm sùi mào gà tại âm đạo thường dẫn đến vùng viêm nhiễm, có tình trạng âm đạo tiết ra chất nhầy không bình thường với màu sắc, độ đặc cũng như mùi hôi lạ.
- Các nốt sùi có thể xuất hiện tại ấu phần ngoài của âm hộ, bên trong âm đạo, cổ tử cung hay tại vùng hậu môn.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc sùi mào gà, cần tìm tới bác sĩ để được thăm khám và trị liệu nhanh chóng. Việc dùng những biện pháp bảo vệ an toàn

trong quan hệ vợ chồng cũng giúp giảm khả năng lây truyền sùi mào gà và một số bệnh truyền nhiễm xã hội khác.

3.2. Dấu hiệu sùi mào gà ở nam

Dưới đây là các dấu hiệu và triệu chứng thường thấy ở nam giới:

- Xuất hiện nốt sùi: Một trong một số biểu hiện ban đầu và dễ thấy nhất của sùi mào gà là sự tạo ra của một số nốt sùi, thường có hình dáng như chùm, cụm thịt có màu hồng hay màu da. Chúng thường mọc tại vùng bìu, quy đầu, dọc theo thân dương vật, lỗ lỗ sáo, ở hậu môn hoặc ở tại vùng da giữa hậu môn cũng như bìu dương vật..
- Ngứa và rất khó chịu: những phái mạnh mắc sùi mào gà thường cảm thấy rằng ngứa cũng như khó chịu

tại vùng sinh dục hoặc xung quanh
lỗ niệu đạo.

- Đau lúc quan hệ tình dục: Sùi mào gà có khả năng khiến quan hệ vợ chồng trở nên đau đớn và không thoải mái bởi những nốt sùi xuất hiện trên đầu hoặc thân dương vật, bao quy đầu, bìu,...
- Chảy máu: Trong những tình trạng, sùi mào gà có thể dẫn đến xuất huyết lúc chúng bị tổn thương hoặc tạo ra vết thương hở trong quá trình quan hệ nam nữ.
- Sưng, đỏ ở vùng sinh dục: những người có thể thấy ở vùng sinh dục bị sưng và đỏ ửng do sùi mào gà dẫn tới những ổ viêm hay viêm nhiễm.

Tuy thế, trong những hiện tượng, sùi mào gà có thể không phải một số dấu

hiệu cụ thể hoặc không dễ nhận biết đối với cả phụ nữ và đàn ông. vì thế, việc đến khám kỹ lưỡng bởi một số bác sĩ chuyên khoa y tế và thực hiện xét nghiệm là khá quan trọng để chẩn đoán chính xác và chữa trị nhanh chóng.


4. Nguyên do gây ra bệnh sùi mào gà

4.1. Virus HPV dẫn tới Bệnh lý sùi mào gà

Virus HPV (Human Papillomavirus) là virút gây u nhú ở người, là một trong các loại virus lây truyền qua con đường tình dục chủ yếu nhất. HPV là nguyên do chính dẫn tới Bệnh lý sùi mào gà, một bệnh truyền nhiễm xã hội thường thấy.

Khi virút HPV tấn công vào cơ thể, chúng sẽ tấn công các tế bào da và dẫn đến sự thay đổi bộ gen di truyền của

chúng. Điều này có thể dẫn tới tình hình tăng sinh tế bào da và dẫn tới các khối u tuyến tiền liệt (sùi mào gà) ở tại vùng sinh dục và các tại vùng da khác trên khắp cơ thể.



Virus HPV – Nguyên do chính dẫn đến Bệnh sùi mào gà tại mọi giới

4.2. Một số yếu tố nguy cơ cao bị

Bệnh lý sùi mào gà

Những yếu tố nguy cơ cao bị Bệnh lý sùi mào gà gồm có:

- Những đối tượng quan hệ vợ chồng với rất nhiều bạn tình: Người có rất nhiều đối tác tình dục có thể mắc cần Bệnh sùi mào gà cao hơn so với người bình thường. Bởi đường tình dục là đường lan truyền virút HPV – nguyên nhân chính dẫn đến sùi mào gà cũng như một số bệnh dục tình khác điển hình nhất.
- Những đối tượng bị suy giảm hệ miễn dịch: Người có hệ miễn dịch yếu do có bệnh nền hay người đang thực hiện chữa trị bằng một số thuốc ức chế miễn dịch.
- Các đối tượng là con nít có hệ miễn dịch chưa được hoàn thiện cũng là

nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc truyền nhiễm HPV và dẫn tới Bệnh sùi mào gà.

- Những đối tượng bị một số bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như Chlamydia có thể làm tăng khả năng nhiễm HIV nếu như có phơi nhiễm, khiến sức đề kháng suy giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho HPV xâm nhập và dẫn tới hại; bệnh lậu (Gonorrhoea), giang mai (Sifilis) cũng có khả năng dẫn tới các chứng nhiễm trùng, thúc đẩy sự truyền nhiễm và tiến triển của virus HPV, từ đó khiến bệnh nhân dễ bị Bệnh sùi mào gà hơn.
- Các đối tượng dùng hay sử dụng nhiều chất kích thích như thuốc lá cũng như cồn: Hút thuốc lá cũng như uống rượu bia khá nhiều khiến cơ thể mất cân bằng, hệ miễn dịch giảm hệ miễn dịch và dễ dàng bị

lây truyền HPV và mắc Bệnh sùi mào gà.

- Sử dụng chung đồ vệ sinh cá nhân: sử dụng chung đồ vệ sinh cá nhân, nhất là quần áo, đồ lót, khăn tắm, bàn chải đánh răng,... với người bị sùi mào gà có thể lây nhiễm bệnh.

5. Một số thời kỳ tiến triển của Bệnh sùi mào gà

Thông thường, Bệnh lý sùi mào gà sẽ tiến triển và diễn tiến theo 5 giai đoạn chính sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Đây là thời kỳ bắt đầu từ khi người mắc bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho đến lúc bệnh khởi phát. lúc HPV xâm nhập vào cơ thể, virút sẽ bắt đầu bám vào những tế bào, khiến một số tế bào mắc thay đổi gen, làm chúng hoạt

động thất thường, không chết đi theo đúng chu kỳ cũng như nhân lên mau chóng. tại giai đoạn này người bị bệnh sùi mào gà thường không có dấu hiệu chi tiết bệnh. Thời gian ủ bệnh của Bệnh sùi mào gà có thể diễn ra trong vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí là vài năm dựa vào tình trạng sức khỏe của từng người. Trung bình, giai đoạn này thường kéo dài từ 2 đến 9 tháng và phổ biến nhất là 3 tháng.

- Thời kỳ khởi phát: Đây là thời kỳ xuất hiện một số dấu hiệu ban đầu của Bệnh lý sùi mào gà. Thường bắt đầu với sự hình thành của một số nốt sùi mào nhỏ, rải rác, thưa thớt.
- Thời kỳ phát triển: Trong thời kỳ này, Bệnh lý sùi mào gà tiếp tục tiến triển cũng như số lượng nốt sùi mào gà càng ngày càng tăng lên trên trên da hay niêm mạc cũng

như phát triển thành một số hạt lớn hơn tạo thành mào gà. Điều này làm hậu quả đến sinh hoạt tình dục, vệ sinh cá nhân cũng như thính thoảng dẫn đến căng thẳng, băn khoăn cho người bị bệnh.

- Thời kỳ biến chứng: Đây có thể được coi là giai đoạn cuối của Bệnh lý sùi mào gà. nếu không nên điều trị nhanh chóng, Bệnh lý sùi mào gà có khả năng gây ra một số hậu quả như sự lây lan của nốt sùi mào gà đến các bộ phận khác như ở hậu môn, vòm họng hoặc cổ tử cung ở phụ nữ, dẫn đến ung thư cổ tử cung. Trong giai đoạn này, người bệnh còn tạo ra tình trạng bội nhiễm, tại vùng tổn thương do sùi mào gà dẫn đến mắc tiết dịch, lở loét, sưng tấy, dễ ra máu,...
- Giai đoạn tái phát: Sau lúc trị liệu, có khả năng Bệnh sùi mào gà sẽ

không hoàn toàn biến mất. các người có khả năng gặp sự quay trở lại của bệnh, đặc biệt là lúc hệ thống miễn dịch mắc suy giảm hay lúc cơ thể tiếp xúc lại với virút HPV do lối sống chuyện yêu kém an toàn.

Những bệnh nhân sùi mào gà cần được điều trị đúng cách để giảm tỉ lệ quay trở lại cũng như biến chứng. ngoài ra, việc sử dụng biện pháp phòng ngừa như bảo vệ trong chuyện ấy, tiêm chủng vaccine HPV, giữ vệ sinh vùng kín cũng khá quan trọng để giảm thiểu nguy cơ truyền nhiễm bệnh.

6. Bệnh lý sùi mào gà có hậu quả không?

- Ung thư

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục có mối liên hệ mật thiết với ung thư. Bởi sùi mào gà ngoài việc thường dẫn đến bởi virus HPV type 6 và 11 là một số chủng HPV lành tính, chúng còn dẫn tới bởi virút HPV type 16 và 18, là 2 chủng HPV nguy cơ cao dẫn tới ung thư chủ yếu nhất Hiện tại.

Theo kết quả thống kê của Công kiến thức điện tử tỉnh Sơn La, có khoảng 10,2% phụ nữ bị Bệnh sùi mào gà tại cổ tử cung, 5% ở vùng hậu môn và 5% ở âm đạo cũng như sẽ tiến triển thành ung thư. Đối với đàn ông, 15% hiện tượng mắc HPV phát triển thành ung thư sinh dục gồm ung thư dương vật, ở hậu môn cũng như vòm họng.



Sùi mào gà có thể có nguy cơ tiến triển thành ung thư, phổ biến là ung thư cổ tử cung

- Ảnh hưởng tới vấn đề mang thai

Bệnh lý sùi mào gà không trực tiếp gây ra ảnh hưởng tới khả năng mang thai. tuy nhiên, bệnh có thể dẫn tới những hậu quả và trực tiếp liên quan tới việc

có thai.

- Việc bị phải sùi mào gà có khả năng dẫn đến tổn thương cho cổ tử cung, tuyến cổ tử cung, tử cung, âm đạo, âm hộ và cả tại vùng hậu môn. các tổn thương này có khả năng làm giảm nguy cơ mang thai của phụ nữ bằng cách làm giảm độ co bóp của tử cung.
- Nếu như bệnh tuyệt đối không tìm ra kịp thời và trị liệu đúng cách thì có khả năng gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của phụ nữ lúc mang thai. Điều này có thể dẫn đến sẩy thai, tử vong thai nhi hoặc sinh non.
- Tăng tỉ lệ sứt mép tử cung: một số loại HPV có khả năng

gây ra những thương tổn ở cổ tử cung, dẫn tới tình hình sứt mép tử cung, điều này tăng nguy cơ sảy thai hay sinh non.

- lây truyền cho thai nhi: Trong quá trình sinh, nếu người mẹ bị sùi mào gà, có khả năng lây nhiễm cho thai nhi. nếu như bé bị nhiễm HPV, có khả năng dẫn tới các ảnh hưởng như viêm phế quản cũng như dạ dày thực quản.

Tuy nhiên, nhiều phụ nữ mắc sùi mào gà vẫn mang thai và sinh con bình thường. Để đảm bảo an toàn cho mẹ cũng như bé, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa cũng như có kế hoạch chữa trị phù hợp.

- Hậu quả chức năng sinh sản

Hiện nay, thông thường nhận thấy sùi mào gà không hậu quả trực tiếp đến khả năng sinh sản của nam giới hay nữ giới. tuy nhiên, bệnh có thể dẫn đến các hậu quả đáng lo ngại, hậu quả đến sức khỏe sinh sản nếu tuyệt đối không chẩn đoán và chữa trị kịp thời.

Với phụ nữ, sùi mào gà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản theo những cách sau:

- Sùi mào gà tiềm ẩn nguy cơ diễn tiến thành ung thư cổ tử cung nếu tác nhân dẫn đến sùi mào gà được xác định do HPV type 16 cũng như 18. Ung thư cổ tử cung tước đoạt thiên chức làm mẹ của nữ giới, hậu quả nguy hiểm đến chức năng sinh sản của họ.

- Bệnh có thể dẫn đến tổn thương mô niệu sinh dục, dẫn đến tăng khả năng viêm nhiễm và viêm tại vị trí tử cung, âm đạo hay vùng chậu gây trở ngại trong việc thụ thai.
- Một số dạng giải phẫu chữa trị sùi mào gà (như đốt, tiểu phẫu cắt hay dòng bỏ...) có khả năng gây thương tổn tới ở tại vùng sinh dục, hậu quả tới chức năng tiếp xúc tình dục hoặc mang thai.

Xem thêm các bài về Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở Nam, Nữ, Miệng, Lưỡi:

- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)

- thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- thuốc trị sùi mào gà tại nhà

Với phái mạnh, Bệnh sùi mào gà không thể nào trị liệu kịp thời cũng như đúng

cách có thể dẫn đến chứng tắc nghẽn niệu đạo, tắc nghẽn ống dẫn tinh, làm biến dạng bộ phận sinh dục nam, làm suy giảm tỉ lệ sinh sản của phái mạnh. một số nghiên cứu còn chỉ ra, virút HPV gây ra sùi mào gà còn có khả năng làm suy giảm khả năng vận động của tinh trùng, gây mất khả năng sinh sản ở phái mạnh.

Việc tiếp cận cũng như điều trị sớm Bệnh lý sùi mào gà, song song đó tiến hành việc ngăn ngừa lây nhiễm sẽ giúp giảm nguy cơ các biến chứng gây ra hậu quả tới chức năng sinh sản cũng như chất lượng cuộc sống sau này.

7. Chẩn đoán sùi mào gà

Chẩn đoán sùi mào gà có khả năng giúp người bệnh tự giác nắm bắt được hiện trạng mắc bệnh của bản thân để nhanh chóng tiếp nhận những liệu pháp trị liệu

khoa học tại giai đoạn sớm, giúp hiệu quả chữa trị bệnh được tối ưu. có khả năng chẩn đoán Bệnh sùi mào gà qua các triệu chứng trên lâm sàng sau:

- Tạo ra các u nhỏ màu hồng hay màu da, tạo ra thành mụn nước hoặc mọc thành từng nhóm, thường giống như cụm sùi. các u này thường hình thành ở vùng nhạy cảm, bao gồm vùng nhạy cảm, hậu môn, môi, miệng và lưỡi, gây ra cảm giác đau đớn, ngứa ngáy hay không thoải mái ở tại vùng có một số u, thỉnh thoảng có xuất huyết, đặc biệt là khi chuyện yêu. bác sĩ có thể thăm khám bằng mắt thường để phát hiện ra một số biểu hiện này.
- Dùng tinh thể axit axetic: chuyên gia có khả năng sử dụng tinh thể axit acetic để làm sáng những ở tại

vùng mắc nhiễm sùi mào gà. khi tiếp xúc với cụm mụn, tinh thể này sẽ biến mụn trở phải trắng sáng, giúp phát hiện nhanh hơn. có khả năng bôi lên cũng như để trên nhô lên khỏi da từ 2 đến 5 phút, riêng với ở hậu môn là khoảng 15 phút để tinh thể có thể phát huy công dụng.

- Lấy mô bệnh phẩm: nếu như những kỹ thuật trên không chính xác hoặc chưa đáp ứng, bác sĩ có khả năng lấy trực tiếp một loại mô từ những vùng bị nhiễm sùi mào gà (nốt mụn, u nhú,...) để đưa vào phòng thí nghiệm, phân tích và xem xét bằng kính hiển vi nhằm xem bên trong những nốt sùi có chứa virút dẫn đến Bệnh sùi mào gà hay không? Bệnh đang chuyển biến phức tạp tại thời kỳ nào?.
- Xét nghiệm máu: Xét nghiệm này

được ứng dụng với một số đối tượng đang nghi ngờ bản thân bị sùi mào gà tuy nhiên chưa hình thành các dấu hiệu dễ thấy. mẫu máu của đối tượng được đem đi xét nghiệm tìm kiếm sự hiện diện của virút HPV.

- Xét nghiệm loại dịch: virút gây ra sùi mào gà có thể khu trú trong dịch tiết của người bệnh, chẳng hạn như dịch âm đạo tại nữ giới và dịch niệu đạo ở nam), cần việc xét nghiệm dòng dịch có khả năng xác định được tình trạng lây nhiễm cũng như diễn biến của bệnh.
- HPV Cobas – Test: phương thức này lấy một loại tế bào đã chết tại cổ tử cung nữ giới để thực hiện xét nghiệm tầm soát tế bào ung thư cổ tử cung cũng như thực hiện những xét nghiệm tìm kiếm sự hiện diện của virút HPV cùng một lúc. Công nghệ xét nghiệm HPV Cobas – Test

có độ nhạy phát hiện bệnh và virút dẫn đến bệnh cực kỳ cao có thể lên tới 90-95%.

- Xét nghiệm PCR xác định type HPV: phương pháp chẩn đoán này giúp chuyên gia xác định bệnh nhân có nhiễm HPV dẫn tới sùi mào gà hay không? nếu có, xác định được HPV gây ra bệnh thuộc type nào? Xét nghiệm này được thực hiện qua dòng bệnh phẩm được lấy từ cổ tử cung, âm đạo hay mảnh sinh thiết ở cổ tử cung nữ giới, mẫu niệu đạo/ dịch niệu đạo ở đàn ông.

Nếu phát hiện sùi mào gà từ bất kỳ phương pháp nào, b.sĩ sẽ dẫn ra phương án chữa trị phù hợp, căn cứ vào mức độ và hiện trạng của bệnh.



Nếu như nghi ngờ bản thân mắc Bệnh lý sùi mào gà, phải ngay lập tức tới gặp bác sĩ hay bác sĩ chuyên khoa y tế để được chẩn đoán và trị liệu kịp thời.

8. Cách phòng Bệnh lý sùi mào gà

8.1. Tiêm ngừa vắc xin Gardasil/Gardasil 9 để ngăn ngừa

virút HPV

Vắc xin Gardasil và Gardasil 9 là dòng vắc xin được dùng để ngăn ngừa sự xâm nhập của virút Human Papillomavirus (HPV), dẫn đến một số bệnh truyền nhiễm xã hội. Vắc xin Gardasil đã được chứng minh là có hiệu quả bảo vệ cũng như đảm bảo tính an toàn sau tiêm cao, đã được ứng dụng tiêm chủng dự phòng các căn bệnh dục tình do HPV gây ra trên rất nhiều quốc gia, trong đấy có Việt Nam.

Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC đang có đầy đủ 2 loại vắc xin phòng HPV với hiệu quả bảo vệ cao Hiện nay là Gardasil 4 và Gardasil 9. Trong đấy, Gardasil 4 là vắc xin tứ giá với khả năng bảo vệ cơ thể khỏi 4 chủng virus HPV hay thấy tại người là HPV 6, 11, 16 và 18.

Vắc xin Gardasil có thể phòng một số căn bệnh do nhiễm virút HPV như u nhú sinh dục (sùi mào gà, mụn cóc sinh dục), ung thư cổ tử cung, ung thư vòm họng, ung thư vùng hậu môn,... được kê toa dành cho con nít gái và phụ nữ trong độ tuổi từ 9 đến 26 tuổi.

Bên cạnh Gardasil 4, còn có vắc xin Gardasil 9 với hiệu quả cũng như phạm vi bảo vệ vượt trội hơn, có thể bảo vệ cơ thể khỏi sự lan truyền của 9 chủng virút HPV nguy hiểm và điển hình nhất Ngày nay là HPV type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 cũng như 58.

do vậy, Gardasil 9 có thể phòng bệnh ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, ung thư dương vật, ung thư tại vùng hậu môn, các thương tổn tiền ung thư cũng như loạn sản, mụn cóc sinh dục cũng như căn bệnh do nhiễm virus HPV,... với hiệu quả bảo vệ gần như tuyệt đối, lên

đến 94%. Vắc xin Gardasil 9 được chỉ định tiêm chủng cho trẻ nhỏ nam, trẻ nhỏ nữ, thanh niên nam nữ, cộng đồng LGBT, MSM,... từ 9 tới dưới 27 tuổi.

8.2. Thăm khám sức khỏe định kỳ

Thăm khám sức khỏe định kỳ là một kỹ thuật cần thiết trong việc đảm bảo sức khỏe tổng thể của mỗi người, đặc biệt là việc phát hiện ra cũng như phòng ngừa bệnh tật. Trong số một số bệnh tật mà khám sức khỏe định kỳ có khả năng phòng ngừa được, sùi mào gà là một trong một số bệnh lan truyền tương đối cơ bản, đặc biệt trong giới trẻ.

Việc thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ có khả năng giúp ngăn ngừa được sùi mào gà giúp phát hiện ra nhanh chóng mầm mống dẫn đến bệnh, từ đấy chủ động áp dụng những giải pháp ngăn chặn sự diễn tiến nguy hiểm của bệnh.

Theo khuyến cáo của chuyên gia, phải thực duy trì thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ đều đặn mỗi 6 tháng 1 lần vì cứ chu kỳ nửa năm, cơ thể người lại bắt đầu tạo ra các thay đổi đáng kể.



Để đảm bảo sức khỏe cũng như phòng tránh tối đa sùi mào gà, mọi người cần thực hiện khám sức khỏe định kỳ và tuân theo một số giải pháp phòng ngừa

đề xuất bởi các chuyên gia y tế.

8.3. Đời sống tình dục lành mạnh

Sinh hoạt tình dục lành mạnh chẳng thể hoàn toàn phòng ngừa được sùi mào gà, tuy nhiên có thể hạn chế nguy cơ bị bệnh. Sùi mào gà là một bệnh nhiễm trùng ở vùng kín do virút dẫn đến, gọi là virus HPV (Human Papillomavirus). các giải pháp giúp giảm khả năng bị Bệnh sùi mào gà bằng cách sinh hoạt tình dục lành mạnh bao gồm:

- Dùng những biện pháp an toàn lúc giao hợp tình dục: dùng bao cao su có thể giúp giảm tỉ lệ truyền nhiễm HPV trong các cuộc giao hợp. tuy nhiên, BCS không có là biện pháp 100% an toàn, vì không thể bảo vệ toàn bộ khu vực chưa được che phủ bởi bao cao su. thêm nữa, nên giảm thiểu tối đa tình trạng chuyện ấy

thông qua đường miệng.

- Duy trì mỗi giao hợp hôn nhân chung thủy 1 vợ - 1 chồng, không giao hợp tình dục với nhiều bạn tính, nhất là với những bạn tình chưa được xác định rõ tình trạng sức khỏe.

8.4. Bỏ ngay các thói quen xấu

Để phòng ngừa Bệnh lý sùi mào gà, cần phải từ bỏ các thói quen xấu Bên dưới liền, bởi chúng là một số yêu cầu thúc đẩy cơ thể bị bị Bệnh sùi mào gà:

- Quan hệ nam nữ không an toàn: Bệnh lý sùi mào gà được lây nhiễm chủ yếu thông qua con đường dục tình. cần chú ý dùng bao cao su trong quá trình quan hệ cũng như chỉ nên phát sinh quan hệ vợ chồng với 1 bạn tình đã thử nghiệm sức

khỏe an toàn.

- Chia sẻ vật dụng cá nhân: những dụng cụ như dao cạo, khăn tắm, quần áo nội y nên sử dụng riêng, không chia sẻ với người khác để tránh tiếp xúc trực tiếp với các tế bào mắc nhiễm HPV, tác nhân dẫn đến sùi mào gà.
- Thói quen sống kém lành mạnh: hạn chế các cuộc vui, ăn chơi bừa bãi, không xuất hiện trong môi trường nhiều nguy cơ dẫn tới bệnh như quán bar, hộp đêm.
- Sử dụng chất kích thích như hút thuốc và uống rượu bia: Hút thuốc lá và uống quá nhiều rượu bia có thể làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể, dễ dàng dẫn tới các căn bệnh, trong đấy có sùi mào gà.
- Thói quen xấu lúc vệ sinh cơ thể:

nên vệ sinh cơ thể hàng ngày, chăm chỉ thay quần áo, thường xuyên lau rửa bộ phận sinh dục giúp phòng ngừa nguy cơ bị bệnh lây lan từ tế bào HPV.

9. Các cách thức trị liệu sùi mào gà

Mặc dù sùi mào gà hầu hết đều biểu hiện thông qua những dấu hiệu là nốt sùi lành tính tuy nhiên bệnh vẫn có thể gây nên rất nhiều tác hại nguy hiểm nếu nguyên nhân gây ra bệnh là các chủng virus HPV thuộc phân nhóm nguy cơ cao dẫn đến ung thư.

Đối với những trường hợp bệnh tuyệt đối không chăm sóc đúng cách và trị liệu kịp thời, sùi mào gà có khả năng tiến triển nặng nề hơn, dẫn đến biến dạng tại chỗ (niêm mạc miệng, bộ phận sinh dục, vùng hậu môn, vòm họng,...) hoặc

phát triển thành ung thư biểu mô tế bào vảy dạng nhú (sùi mào gà khổng lồ), một số nốt sần dạng Bowen, loạn sản,...

Chưa kể đến, sùi mào gà còn dẫn đến cản trở quá trình sinh nở, dẫn tới hại cho thai nhi. do vậy, dù nặng hay nhẹ, sùi mào gà phải được chú ý chăm sóc đúng cách và tiến hành trị liệu càng sớm càng tốt. Một vài kỹ thuật chữa trị sùi mào gà phổ biến Hiện tại gồm có:

- Trị liệu bằng thuốc: Có khá nhiều mẫu thuốc có khả năng sử dụng để trị liệu sùi mào gà, bao gồm kem bôi thoa, thuốc,.. với tác dụng làm khô cũng như làm rụng những u sùi. một số thuốc đặc điều trị sùi mào gà chủ yếu như Podophyllin (podofilox), Sinecatechins, Bichloroacetic acid (BCA), Trichloroacetic acid (TCA) nồng độ cao từ 80-90%,... Trong đấy, phổ

biến nhất là podofilox được dùng ngoài da với khả năng dẫn tới độc chết tế bào gây hại tại chỗ, khiến chúng ngừng phân chia, khiến mô mắc hoại tử cũng như tự tiêu biến.

- Điều trị bằng liệu trình nhiệt trị liệu điện (Electrocautery): phương thức này sử dụng loại điện để làm nóng cũng như nhiệt trị liệu cháy những u sùi, tiêu diệt virút gây bệnh.
- Điều trị bằng phẫu thuật: cách thức này được sử dụng để tiểu phẫu cắt bỏ một số khối/ mảng/ cụm/ nốt sùi mào gà ở chỗ. Đây là cách thức phù hợp để áp dụng cho một số tình trạng chưa đáp ứng với các kỹ thuật khác.
- Chữa trị bằng liệu trình lạnh (Cryotherapy): Là kỹ thuật dùng nhiệt độ cực thấp bằng cách xịt nitơ lỏng lên tại vùng mắc tổn thương

do sùi mào gà dẫn đến dễ gây ra đông lạnh, làm hư hại tế bào sùi mào gà, cuối cùng làm rụng các u. kỹ thuật này rất an toàn, có thể ứng dụng để điều trị cho các đối tượng là phụ nữ đang mang thai, tuy cách thức này lại gây ra khá nhiều bất tiện sau khi thực hiện như có thể gây ra hoại tử tế bào, đau đớn, bỏng lạnh, rát, dẫn tới bọng nước cũng như để lại sẹo.

- Chữa trị bằng laser CO2 (Vaporization): kỹ thuật này dùng tia laser để nhiệt trị liệu và làm sạch các khối u sùi mào gà.
- Tăng cường/ điều hòa hệ miễn dịch: Bổ sung vitamin C, E, A, Zinc, Selenium và L-Arginine để tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại HPV và giảm tỉ lệ quay trở lại sùi mào gà. hoặc sử dụng các loại thuốc bôi bên ngoài da hoặc

dạng tiêm để điều hòa miễn dịch trên những vùng thương tổn do sùi mào gà dẫn tới như Interferon, Imiquimod, Sinecatechin, ...

Phải tìm hiểu kỹ về phương pháp điều trị sùi mào gà nào phù hợp nhất với tình hình của mình và tham khảo ý kiến của chuyên gia trước lúc tiến hành trị liệu.

10. Cách chăm sóc người bệnh sùi mào gà

Để chăm sóc bệnh nhân sùi mào gà, có khả năng tham khảo thực hiện một số biện pháp sau đây:

- Đảm bảo vệ sinh cá nhân: người bệnh nên giữ vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ, tắm rửa hàng ngày bằng nước ấm cũng như xà phòng lành tính với da. Tránh sử dụng đồ

dùng cá nhân chung như khăn tắm, quần áo với người khác để tránh lan truyền.

- Trị liệu đúng cách: bệnh nhân phải tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được kê toa điều trị phù hợp. Có khá nhiều phương thức chữa trị sùi mào gà như đốt điện, điều trị bằng laser, quang động trị liệu, hay sử dụng thuốc bôi đặc trị,... bệnh nhân phải tuân thủ đúng quy trình trị liệu, không tự ý dùng thuốc hay thay đổi liều lượng.
- Hạn chế giao hợp tình dục: bệnh nhân phải hạn chế chuyện phòng the để tránh lây truyền cho đối tác và tránh làm thương tổn ở tại vùng bệnh. nếu giao hợp, nên dùng bao cao su hay màng chắn y khoa.
- Giảm stress: Cân bằng cuộc sống, giữ tâm trạng thoải mái, ăn uống và

sinh hoạt đúng giờ giúp cơ thể giảm căng thẳng, tăng cường sức đề kháng để chống lại virút.

- **Bổ sung dinh dưỡng:** Ăn khá nhiều rau, quả, hạt, chất xơ và protein; tránh thực phẩm giàu đường, chất béo và đồ ăn nhanh để cải thiện sức khỏe và giải đáp trị liệu.
- **tư vấn tinh thần:** Động viên, an ủi và hỗ trợ người bệnh trong quá trình chữa trị để họ không cho rằng cô đơn hay sức ép.
- **Theo dõi cũng như kiểm tra:** bệnh nhân nên tham khảo ý kiến chuyên gia định kỳ trong quá trình trị liệu cũng như sau lúc hoàn thành trị liệu để đảm bảo hiệu quả và theo dõi sát sao bất kỳ biến chứng nào có khả năng xảy ra, từ đấy đưa ra những phương pháp xử lý nhanh chóng.

11. Các câu hỏi hay gặp về sùi mào gà

- Sau khi bị nhiễm HPV bao lâu thì sùi mào gà xuất hiện?

Trong những hiện tượng, sùi mào gà có khả năng tạo ra từ vài tuần tới vài tháng sau khi tiếp xúc với virus. tuy nhiên, có các người có thể không bao giờ phát triển sùi mào gà dù đã nhiễm HPV.

Trong một số trường hợp, hệ thống miễn dịch của cơ thể có khả năng tiêu diệt virus HPV trước lúc nó dẫn đến bất kỳ triệu chứng hay hậu quả nào, trong khi các tình trạng khác có thể phát triển sùi mào gà cũng như các hậu quả liên quan.

nếu bạn trăn trở về sức đề kháng của mình hay nghi ngờ rằng bạn có thể đã tiếp xúc với HPV, hãy tham khảo ý kiến

của chuyên gia hay bác sĩ chuyên khoa y tế để được khám cũng như tư vấn điều trị phù hợp.

- Sùi mào gà có thể tự khỏi không?

KHÔNG. Ngày nay vẫn chưa có bất kỳ kỹ thuật hoặc dòng thuốc nào có khả năng chữa trị đặc hiệu Bệnh lý sùi mào gà. Bởi nguyên nhân chính dẫn tới Bệnh lý sùi mào gà là các chủng virút HPV, vì vậy để trị liệu được sùi mào gà, nhất thiết phải chữa trị triệt để sự hiện diện cũng như dẫn tới hại của những chủng virus này. tuy nhiên ở thời điểm Hiện tại vẫn chưa có kỹ thuật điều trị triệt để HPV, vì thế sùi mào gà không thể tự khỏi cần việc ngăn ngừa là yếu tố được ưu tiên tốt nhất đối với căn bệnh cực kỳ dai dẳng và không thoải mái này.

- Sùi mào gà có để lại sẹo không?

Có khả năng. Dù bằng phương pháp điều trị nào, sùi mào gà vẫn để lại sẹo, bởi đây là các tổn thương tại cấp độ tế bào, rất khó có khả năng lành lại như trạng thái đầu tiên. tuy, vẫn có thể lưu ý những biện pháp sau để giảm thiểu tối đa sự mất thẩm mỹ của sẹo do sùi mào gà để lại dẫn tới ra:

- Chọn phương thức trị liệu phù hợp với tình hình bệnh lý của bản thân, phải tham khảo ý kiến chuyên gia để dẫn ra quyết định chính xác nhất.
- Sau lúc trị liệu, cần chú ý chăm sóc vết thương đúng cách để vết thương mau lành và giảm nguy cơ để lại sẹo lớn, mất thẩm mỹ.
- Ngừng sử dụng thuốc chữa trị hoặc thay đổi cách thức trị liệu theo kê toa của b.sĩ nếu như thấy kết quả

không như mong muốn hoặc có những biến chứng không mong muốn xảy ra.

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở Nam, Nữ, Miệng, Lưỡi



Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở Nam, Nữ, Miệng, Lưỡi, Thuốc chữa trị Sùi Mào Gà Podophyllin 25 tại nhà



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật thông tin tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên giải đáp giải thích nhiệt tình đến lúc khỏi hẳn.

Kiên trì thực hiện chữa trị cho tới khi sùi mào gà toàn bộ biến mất, để tránh sự

quay trở lại của bệnh cũng như làm tăng nguy cơ để lại sẹo.

Bệnh lý sùi mào gà không chỉ dẫn tới các biểu hiện sùi lành tính trên trên da mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, tâm lý, gây ra một số biến chứng nguy hiểm như viêm nhiễm, biến dạng vùng nhạy cảm, sinh ung thư, hậu quả xấu tới chức năng sinh sản tại cả nữ giới và nam giới.

Do vậy, đối với Bệnh sùi mào gà, ngăn ngừa là cách đối mặt tốt nhất, giúp cơ thể dự phòng được sự tấn công cũng như gây ra hại của virus HPV – nguyên nhân chính dẫn tới sùi mào gà và những bệnh lây qua con đường tình dục phổ biến cũng như nghiêm trọng nhất Ngày nay.