

Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nam, Nữ giai đoạn đầu

1. Sùi mào gà là bệnh gì?

Sùi mào gà (thuoc-tri-sui-mao-ga-tai-nha) là bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, gây ra bởi virus Human Papilloma Virus (HPV). Sùi mào gà là nguyên nhân gây ra những mô sùi hình bông cải hoặc mào gà tạo thành trên nhô lên khỏi da hay niêm mạc miệng, vùng kín và hậu môn của cả nữ giới và nam giới. Sùi mào gà có thể dẫn tới không thoải mái, ngứa cũng như đau, và hậu quả đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe tâm lý của người bị bệnh. [1]

Theo kết quả thống kê của Trung tâm

kiểm soát cũng như ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ), sùi mào gà hậu quả tới khoảng 340.000 tới 360.000 người mỗi năm. Trong khi đấy, tình hình ở Việt Nam cũng không khả quan hơn khi số ca mắc mới liên tục gia tăng đặc biệt là tại một số đô thị lớn. Bệnh có thể hình thành tại mọi giới, nhất là các đối tượng bị suy giảm sức đề kháng và những đối tượng có hoạt động tình dục.

Bệnh sùi mào gà có khả năng xuất hiện tại cả nữ giới và nam, nhưng thường dễ dàng nhận thấy hơn ở phái mạnh. Bên dưới là các vị trí hay gặp sùi mào gà:

- Vùng kín: Sùi mào gà thường xuất hiện ở những ở vùng da và niêm mạc tiếp xúc với nhiễm trùng trong quá trình quan hệ nam nữ. vị trí phổ biến nhất là quanh và trên vùng nhạy cảm ngoài, như âm đạo, lỗ tiểu, lớp da bọc dương vật, dương

vật, bên trong ở vùng hậu môn, cũng như nốt tại vùng hậu môn. Chưa kể đến, vùng da nằm giữa âm đạo cũng như ở vùng hậu môn hay bìu bộ phận sinh dục nam và vùng hậu môn cũng là một trong những khu vực tạo ra thường gặp của sùi mào gà.

- Da quanh tại vùng sinh dục: bên ngoài những khu vực trên, sùi mào gà còn có thể phát triển trên một số tại vùng da ngay lập tức kề, như đùi, hông cũng như ở tại vùng bụng dưới.
- Miệng cũng như họng: nếu có tiếp xúc với virus HPV qua hoạt động tình dục miệng, sùi mào gà có khả năng hình thành ở miệng, môi, lưỡi, nướu, cũng như họng.

Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở

Nam, Nữ giai đoạn đầu



Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nam, Nữ giai đoạn đầu, Thuốc điều trị Sùi Mào Gà Podophyllin 25 tại nhà



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật thông tin tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên đưa ra lời khuyên hỗ trợ nhiệt tình tới khi khỏi hẳn.

1.1. Sùi mào gà lây thông qua đường nào?

Sùi mào gà có khả năng lan truyền thông qua khá nhiều con đường và hình thức không giống nhau, bao gồm:

- Giao hợp tình dục: giao hợp quan hệ với nhiều người là con đường lây nhiễm chủ yếu nhất của sùi mào gà, kể cả việc chuyện yêu thông qua hậu môn hoặc bằng con đường miệng.
- Tiếp xúc trực tiếp: Sùi mào gà cũng có khả năng truyền nhiễm lúc tiếp xúc với da hay niêm mạc tại bộ phận sinh dục của người bị nhiễm bệnh, ngay cả khi không có giao hợp.
- Dùng chung vật dụng cá nhân: Việc chia sẻ một số vật dụng cá nhân như khăn tắm, quần áo, đồ lót, bàn chải đánh răng, dụng cụ ăn uống,... khiến chúng bị tiếp xúc với người mắc nhiễm bệnh cũng có khả năng là một nguy cơ lây nhiễm phải chú ý.
- Sinh hoạt ở một số nơi có nguy cơ

lây truyền cao: sử dụng chung các dụng cụ làm đẹp (bấm móng tay, dao cạo, kéo, sơn móng tay,...), massage (khăn, giường, một số dụng cụ massage,...) hoặc các dịch vụ tiếp xúc da kề da của người nhiễm cũng có khả năng là nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm sùi mào gà.

- Lan truyền từ người mẹ sang con: Trong một số tình trạng hiếm gặp, sùi mào gà có khả năng lây truyền từ người mẹ bị nhiễm sang con trong quá trình sinh nở.

1.2. Bệnh lý sùi mào gà có nguy hiểm đến tính mạng không?

KHÔNG. Bệnh lý sùi mào gà không dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng, bệnh thường gây ra một số đốm nâu hồng hình búi nhọn hay đầu sùi mào gà trên vùng kín, âm đạo, dương vật, ở hậu môn

cũng như ở vùng xung quanh miệng. tuy, bệnh có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng đời sống của người bệnh như:

- Đau đớn, ngứa cũng như chảy máu: những mụn sùi mào gà có thể gây ra đau, ngứa, hoặc chảy máu lúc chuyện yêu hoặc đi nặng.
- Tăng khả năng bị ung thư: những chủng HPV dẫn tới sùi mào gà có thể liên quan tới nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung, âm đạo, dương vật hoặc vùng hậu môn.
- Hậu quả đến sinh sản: Bệnh có thể dẫn tới hậu quả tới chức năng sinh sản của nữ giới, nhất là với các đối tượng nữ giới có thương tổn tại cổ tử cung.
- Ảnh hưởng tới sự tự tin, sức khỏe tâm lý: Bệnh lý sùi mào gà có khả

năng dẫn đến cảm giác bất tiện, mất tự tin cũng như ảnh hưởng tới mỗi đời sống chẵn gối của người bệnh.

2. Hình ảnh sùi mào gà

2.1. Hình ảnh sùi mào gà tại nam

Bệnh sùi mào gà là một bệnh lây truyền qua con đường dục tình cơ bản ở đàn ông, có khả năng dẫn đến các khó chịu, tuy nhiên hiếm lúc gây ra những nghiêm trọng tới tính mạng. những triệu chứng của Bệnh sùi mào gà thường bao gồm một số chấm đỏ hay sần sùi hình thành trên đầu hay thân dương vật, bìu, những vị trí xung quanh, ở vùng hậu môn và đằng sau niêm mạc của dương vật. các nốt/ cụm sùi này có khả năng khiến người bị bệnh lo sợ và cũng có thể mang tới các cơn ngứa và đau rát cho một số quý ông.

Sự xuất hiện của sùi mào gà ở nam thường xảy ra trên các ổ vùng da dưới đây:

- Sùi mào gà tạo ra trên niêm mạc sinh dục như vùng bộ phận sinh dục nam, bao quy đầu cũng như khu vực xung quanh.
- Một số tại vùng da bất kỳ trên cơ thể như ngực, bụng, tay, chân cũng như lưng.
- Vị trí ở vùng hậu môn cũng như trực tràng, trên niêm mạc miệng, lưỡi cũng như họng, đặc biệt là ở một số người có phát sinh quan hệ vợ chồng đồng tính nam qua đường hậu môn và miệng.



Có khoảng 90% nam giới mắc Bệnh lý sùi mào gà do quan hệ tình dục bừa bãi.

2.2. Hình ảnh sùi mào gà tại nữ

Sùi mào gà tại nữ giới thường bắt đầu bằng những đốm nhỏ có màu trắng hoặc hồng xuất hiện trên một số bộ phận sinh dục của cơ thể như âm đạo, vùng nhạy cảm bên ngoài, vùng hậu môn và ở tại

vùng chậu. một số đốm này sẽ dần phát triển thành các cụm thịt lồi màu da, có đường viền nổi rõ cũng như thường dẫn tới ngứa, đau rát cũng như vô cùng khó chịu. nếu không thể nào chữa trị nhanh chóng, sùi mào gà tại nữ giới có thể phát triển thành ung thư, cơ bản là ung thư cổ tử cung.

Sự xuất hiện của sùi mào gà có thể xảy ra ở nhiều vị trí không giống nhau trên cơ thể của nữ giới, đặc biệt là ở vùng nhạy cảm. Sau đây là một số khu vực hay thấy của sùi mào gà ở nữ giới:

- Ở tại vùng kín: Sùi mào gà thường tạo ra ở vùng kín, bao gồm cả ở vùng âm đạo, tại vùng hậu môn và ngoài âm hộ.
- Vùng đùi: nếu như virút HPV lan truyền vào lỗ âm đạo, có thể làm cho sùi mào gà hình thành ở vùng ở

xung quanh đùi.

- Cổ tử cung: ở những trường hợp nghiêm trọng hơn, sùi mào gà có thể lan rộng lên cổ tử cung của nữ giới.
- Tại vùng hậu môn: nếu như virus HPV truyền nhiễm vào đường vùng hậu môn, nó có khả năng dẫn tới sùi mào gà ở vùng này và một số vị trí xung quanh như phần da giữa ở vùng hậu môn và bộ phận sinh dục.

Tuy, sự hình thành của sùi mào gà tại nữ giới có thể khác nhau căn cứ vào từng trường hợp chi tiết. nếu nữ giới nghi ngờ mình có sùi mào gà ở bất kỳ vị trí nào, điều cần thiết là họ cần tìm kiếm sự chẩn đoán cũng như chữa trị từ chuyên gia phụ khoa để phòng ngừa bệnh lây lan và tác động đến sức khỏe của mình.

Có khoảng 60% nữ giới mắc Bệnh sùi mào gà do quan hệ bằng đường hậu môn hay miệng.

Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nam, Nữ giai đoạn đầu



Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nam, Nữ
giai đoạn đầu, Thuốc trị liệu Sùi Mào Gà
Podophyllin 25 tại nhà



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn tư vấn nhiệt tình tới lúc khỏi hẳn.

2.3. Sùi mào gà cũng như mụn cóc sinh dục giống hoặc khác

nhau?

Khác nhau. Sùi mào gà cũng như mụn cóc sinh dục là hai bệnh lý gây ra do Human Papillomavirus (HPV). Dù cả hai đều là kết quả của sự truyền nhiễm HPV nhưng chúng có những khác biệt cần thiết về mẫu HPV gây ra các dấu hiệu, biểu hiện lâm sàng, cũng như một số nguy cơ liên quan.

Sùi mào gà cũng như mụn cóc sinh dục đều cơ bản dẫn đến bởi một số chủng HPV nguy cơ thấp như HPV type 6 và HPV type 11. Chúng thường tạo ra trên nhô lên khỏi da vùng niêm mạc miệng và sinh dục như bộ phận sinh dục nam, âm đạo, vùng hậu môn cũng như một số ở vùng xung quanh. Cả sùi mào gà cũng như mụn cóc sinh dục thường không gây ra nguy cơ cao về ung thư, tuy nhiên sẽ gây ra cảm giác khó chịu cũng như đau đớn cho người nhiễm bệnh.

Sùi mào gà, về dấu hiệu lâm sàng, sùi mào gà có dạng hình giống như những mảng gai nhỏ, chóp nhọn và có thể phát triển thành những khối lớn như mào gà hay bông cải.. Trong lúc đó, mụn cóc sinh dục có khả năng xuất hiện tại nhiều hình dạng và kích thước không giống nhau, từ mụn nhỏ phẳng chỉ có khả năng quan sát cụ thể với kính hiển vi tới những gai nhô lên trên nhô lên khỏi da có thể nhìn thấy được.

Tóm lại, mụn cóc sinh dục cũng như sùi mào gà đều do nhiễm virus HPV, tuy nhiên chúng có các nguyên do, triệu chứng, khu vực, và cách thức chữa trị khác nhau.

3. Các biểu hiện sùi mào gà

3.1. Triệu chứng sùi mào gà ở nữ

Sùi mào gà là một căn bệnh xã hội, do

virút dẫn tới u nhú ở người (HPV) gây ra. triệu chứng sùi mào gà ở nữ có thể không giống nhau tùy thuộc theo tình trạng, Sau đây là những triệu chứng thường gặp:

- Xuất hiện các nốt sùi: các nốt sùi nhỏ mọc lên tại vùng nhạy cảm hay xung quanh, thường có màu hồng hay da, hình thù giống như cụm sùi của bông cải hoặc mào gà. Nốt sùi có khả năng mọc đơn lẻ hay thành nhóm.
- Ngứa và rất khó chịu: Nữ giới bị sùi mào gà thường cảm thấy ngứa và khó chịu tại bộ phận sinh dục, đặc biệt khi một số nốt sùi phát triển cũng như lan rộng.
- Sưng và đau: lúc bị nhiễm sùi mào gà, bộ phận sinh dục có thể sưng đỏ cũng như đau nhức, gây khó khăn trong quá trình đi tiểu hoặc

quan hệ vợ chồng.

- Xảy ra chảy máu: các nốt sùi mào gà khi bị tổn thương có thể xuất huyết, đặc biệt sau lúc chuyện phòng the hay khi vệ sinh vùng kín.
- Âm đạo tiết ra chất nhầy: Nữ giới mắc nhiễm sùi mào gà tại âm đạo thường dẫn đến tại vùng nhiễm trùng, có hiện tượng âm đạo tiết ra chất nhầy không bình thường với màu sắc, độ đặc và mùi hôi lạ.
- Một số nốt sùi có khả năng tạo ra tại ấu phần bên ngoài của âm hộ, bên trong âm đạo, cổ tử cung hay hậu môn.

Nếu như tìm ra dấu hiệu nghi ngờ mắc sùi mào gà, cần tìm tới b.sĩ để được thăm khám và chữa trị nhanh chóng. Việc sử dụng một số giải pháp bảo vệ an toàn trong quan hệ nam nữ cũng giúp

giảm khả năng truyền nhiễm sùi mào gà cũng như những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

3.2. Dấu hiệu sùi mào gà ở nam

Sau đây là các biểu hiện cũng như dấu hiệu thường xảy ra ở nam giới:

- Hình thành nốt sùi: Một trong các dấu hiệu đầu tiên cũng như rõ ràng nhất của sùi mào gà là sự xuất hiện của những nốt sùi, thường có dạng hình như chùm, cụm thịt có màu hồng hoặc màu da. Chúng thường mọc ở vùng bìu, quy đầu, dọc theo thân dương vật, lỗ miệng sáo, hậu môn hoặc ở tại vùng da giữa tại vùng hậu môn và bìu bộ phận sinh dục nam..
- Ngứa cũng như khó chịu: các phái mạnh mắc sùi mào gà thường cảm

thấy ngứa và không thoải mái tại vùng sinh dục hay xung quanh lỗ miệng sáo.

- Đau lúc quan hệ tình dục: Sùi mào gà có thể khiến quan hệ nam nữ trở nên đau đớn và khó chịu bởi các nốt sùi hình thành trên đầu hoặc thân dương vật, lớp da bọc dương vật, bìu,...
- Chảy máu: Trong các trường hợp, sùi mào gà có thể dẫn đến chảy máu lúc chúng bị thương tổn hoặc hình thành vết thương hở trong quá trình chuyện yêu.
- Sưng, đỏ tại vùng sinh dục: một số người có thể thấy vùng sinh dục mắc sưng và đỏ ửng do sùi mào gà gây ra những ổ viêm nhiễm hoặc nhiễm trùng.

Tuy nhiên, trong các tình trạng, sùi mào

gà có khả năng không có các biểu hiện dễ thấy hoặc không dễ nhận biết đối với cả nữ giới và nam. vì thế, việc đến khám kỹ lưỡng bởi một số chuyên gia y tế và thực hiện xét nghiệm là rất quan trọng để chẩn đoán chính xác và trị liệu nhanh chóng.


4. Tác nhân gây ra bệnh sùi mào gà

4.1. Virus HPV dẫn tới Bệnh lý sùi mào gà

Virus HPV (Human Papillomavirus) là virus gây u nhú tại người, là một trong các mẫu virus lây truyền qua con đường tình dục điển hình nhất. HPV là tác nhân chính dẫn tới Bệnh sùi mào gà, một bệnh xã hội thường gặp.

Khi virút HPV tấn công vào cơ thể, chúng sẽ tấn công những tế bào da và

dẫn đến sự thay đổi bộ gen di truyền của chúng. Điều này có khả năng dẫn đến tình hình tăng sinh tế bào da và gây ra các khối u tuyến tiền liệt (sùi mào gà) ở tại vùng sinh dục cũng như những ở tại vùng da khác trên khắp cơ thể.



Virút HPV – Nguyên do chính dẫn đến Bệnh sùi mào gà tại mọi giới

4.2. Một số yếu tố nguy cơ cao mắc Bệnh lý sùi mào gà

Các yếu tố nguy cơ cao bị Bệnh sùi mào gà gồm có:

- Những đối tượng quan hệ tình dục với khá nhiều bạn tình: Người có rất nhiều đối tác dục tình có thể mắc nên Bệnh sùi mào gà cao hơn so với người thông thường. Bởi con đường dục tình là đường lan truyền virus HPV – nguyên do chính gây ra sùi mào gà và những bệnh dục tình khác phổ biến nhất.
- Các đối tượng bị suy giảm hệ miễn dịch: Người có hệ miễn dịch yếu do có bệnh nền hoặc người đang thực hiện trị liệu bằng các thuốc ức chế miễn dịch.
- Các đối tượng là trẻ nhỏ có hệ miễn

dịch chưa được hoàn thiện cũng là nhóm đối tượng nguy cơ cao bị lây truyền HPV cũng như dẫn tới Bệnh lý sùi mào gà.

- Những đối tượng bị các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác như Chlamydia có thể làm tăng nguy cơ nhiễm HIV nếu như có phơi nhiễm, khiến hệ miễn dịch suy giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho HPV tiến công cũng như dẫn tới hại; bệnh lậu (Gonorrhoea), giang mai (Sifilis) cũng có thể gây ra một số chứng viêm nhiễm, thúc đẩy sự truyền nhiễm cũng như phát triển của virus HPV, từ đó khiến người bị bệnh dễ mắc Bệnh sùi mào gà hơn.
- Những đối tượng dùng hoặc lạm dụng chất kích thích như thuốc lá cũng như cồn: Hút thuốc lá và uống rượu bia khá nhiều khiến cơ thể mất cân bằng, sức đề kháng giảm

sức đề kháng và dễ dàng mắc truyền nhiễm HPV cũng như mắc Bệnh sùi mào gà.

- Dùng chung đồ vệ sinh cá nhân: dùng chung đồ vệ sinh cá nhân, nhất là quần áo, đồ lót, khăn tắm, bàn chải đánh răng,... với người bị sùi mào gà có thể truyền nhiễm bệnh.

5. Một số thời kỳ phát triển của Bệnh lý sùi mào gà

Thông thường, Bệnh lý sùi mào gà sẽ tiến triển và diễn tiến theo 5 thời kỳ chính sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Đây là thời kỳ bắt đầu từ khi bệnh nhân tiếp xúc với mầm bệnh cho đến khi bệnh khởi phát. khi HPV tiến công vào cơ thể, virút sẽ bắt đầu bám vào một số tế

bào, khiến các tế bào mắc thay đổi gen, làm chúng hoạt động thất thường, không chết đi theo đúng chu kỳ cũng như nhân lên mau chóng. tại giai đoạn này người bệnh sùi mào gà thường không có biểu hiện chi tiết bệnh. Thời gian ủ bệnh của Bệnh sùi mào gà có khả năng diễn ra trong vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí là vài năm dựa vào sức đề kháng của từng người. Trung bình, giai đoạn này thường kéo dài từ 2 tới 9 tháng cũng như chủ yếu nhất là 3 tháng.

- Thời kỳ khởi phát: Đây là giai đoạn hình thành những triệu chứng ban đầu của Bệnh lý sùi mào gà. Thường bắt đầu với sự hình thành của những nốt sùi mào nhỏ, rải rác, thưa thớt.
- Giai đoạn phát triển: Trong thời kỳ này, Bệnh lý sùi mào gà tiếp tục

tiến triển cũng như số lượng nốt sùi mào gà càng ngày càng tăng lên trên nhô lên khỏi da hay niêm mạc cũng như phát triển thành một số hạt lớn hơn hình thành mào gà. Điều này làm ảnh hưởng tới sinh hoạt tình dục, vệ sinh cá nhân cũng như thi thoảng dẫn tới căng thẳng, trần trở cho bệnh nhân.

- Thời kỳ biến chứng: Đây có thể được coi là thời kỳ cuối của Bệnh lý sùi mào gà. nếu không nên chữa trị kịp thời, Bệnh sùi mào gà có thể gây ra những tác hại như sự lây lan của nốt sùi mào gà đến một số bộ phận khác như tại vùng hậu môn, vòm họng hoặc cổ tử cung ở phụ nữ, dẫn tới ung thư cổ tử cung. Trong giai đoạn này, người bị bệnh còn hình thành tình trạng bội nhiễm, ở tại vùng thương tổn do sùi mào gà dẫn đến bị tiết dịch, lở loét,

sưng tấy, dễ ra máu,...

- Giai đoạn tái phát: Sau lúc điều trị, có thể Bệnh sùi mào gà sẽ không toàn bộ biến mất. các người có khả năng gặp sự tái phát của bệnh, đặc biệt là khi hệ thống miễn dịch mắc suy giảm hay khi cơ thể tiếp xúc lại với virút HPV do lối sống quan hệ tình dục kém an toàn.

Một số bệnh nhân sùi mào gà cần được trị liệu đúng cách để giảm khả năng tái phát và tác hại. mặt khác, việc dùng giải pháp ngăn ngừa như bảo vệ trong chuyện ấy, tiêm chủng vaccine HPV, giữ vệ sinh vùng kín cũng rất cần thiết để hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh.

6. Bệnh lý sùi mào gà có biến chứng không?

- Ung thư

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm xã hội có mối liên hệ mật thiết với ung thư. Bởi sùi mào gà ngoài việc thường dẫn tới bởi virút HPV type 6 cũng như 11 là các chủng HPV lành tính, chúng còn dẫn tới bởi virút HPV type 16 cũng như 18, là 2 chủng HPV nguy cơ cao dẫn tới ung thư cơ bản nhất Hiện tại.

Theo kết quả thống kê của Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, có khoảng 10,2% phụ nữ bị Bệnh lý sùi mào gà ở cổ tử cung, 5% ở ở vùng hậu môn cũng như 5% ở âm đạo cũng như sẽ tiến triển thành ung thư. Đối với nam giới, 15% tình trạng bị HPV tiến triển thành ung thư sinh dục gồm ung thư dương vật, ở vùng hậu môn cũng như vòm họng.



Sùi mào gà có khả năng có nguy cơ phát triển thành ung thư, điển hình là ung thư cổ tử cung

- Ảnh hưởng đến trực trực mang thai

Bệnh lý sùi mào gà không trực tiếp gây ra hậu quả đến chức năng có thai. tuy, bệnh có thể dẫn tới các biến chứng cũng như trực trực liên quan tới việc mang

thai.

- Việc mắc cần sùi mào gà có thể dẫn đến thương tổn cho cổ tử cung, tuyến cổ tử cung, tử cung, âm đạo, âm hộ và cả ở hậu môn. những tổn thương này có thể làm giảm khả năng mang thai của phụ nữ bằng cách làm giảm độ co bóp của tử cung.
- Nếu như bệnh không nên phát hiện ra nhanh chóng cũng như chữa trị đúng cách thì có khả năng gây hậu quả nguy hiểm tới sức khỏe của phụ nữ lúc có thai. Điều này có thể dẫn đến sẩy thai, tử vong thai nhi hay sinh non.
- Tăng khả năng sứt mép tử cung: các loại HPV có khả năng

gây ra các thương tổn tại cổ tử cung, dẫn đến tình hình sứt mép tử cung, điều này tăng tỉ lệ sảy thai hay sinh non.

- lây nhiễm cho thai nhi: Trong quá trình sinh, nếu như người mẹ mắc sùi mào gà, có thể lây truyền cho thai nhi. nếu như bé mắc nhiễm HPV, có khả năng dẫn tới một số hậu quả như viêm nhiễm phế quản cũng như dạ dày thực quản.

Tuy, rất nhiều phụ nữ bị sùi mào gà vẫn có thai cũng như sinh con bình thường. Để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, nên tham khảo ý kiến của chuyên gia cũng như có kế hoạch điều trị phù hợp.

- Hậu quả khả năng sinh sản

Ngày nay, bình thường nhận thấy sùi mào gà không ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng sinh sản của cánh mày râu hoặc nữ giới. tuy, bệnh có khả năng dẫn đến một số tác hại đáng lo ngại, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nếu như không thể nào chẩn đoán cũng như điều trị nhanh chóng.

Với phụ nữ, sùi mào gà có khả năng hậu quả tới sức khỏe sinh sản theo các cách sau:

- Sùi mào gà tiềm ẩn nguy cơ diễn tiến thành ung thư cổ tử cung nếu như tác nhân dẫn đến sùi mào gà được xác định do HPV type 16 cũng như 18. Ung thư cổ tử cung tước đoạt thiên chức làm mẹ của nữ giới, ảnh hưởng nguy hiểm đến khả năng sinh sản của họ.

- Bệnh có thể gây thương tổn mô niệu sinh dục, dẫn đến tăng khả năng viêm và nhiễm trùng tại vị trí tử cung, âm đạo hoặc tại vùng chậu gây ra khó khăn trong việc thụ thai.
- Những dạng giải phẫu chữa trị sùi mào gà (như đốt, cắt hoặc loại bỏ...) có thể dẫn tới tổn thương đến tại vùng sinh dục, hậu quả tới chức năng tiếp xúc dục tình hoặc mang thai.

Xem thêm các bài về Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nam, Nữ giai đoạn đầu:

- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)

- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)

Với cánh mày râu, Bệnh sùi mào gà không thể nào chữa trị nhanh chóng và đúng cách có thể dẫn tới chứng tắc nghẽn lỗ sáo, tắc nghẽn ống dẫn tinh,

làm biến dạng dương vật, làm suy giảm tỉ lệ sinh sản của cánh mày râu. những nghiên cứu còn chỉ ra, virút HPV dẫn tới sùi mào gà còn có khả năng làm suy giảm khả năng di chuyển của tinh trùng, gây ra không còn khả năng sinh sản tại phái mạnh.

Việc tiếp cận cũng như chữa trị sớm Bệnh lý sùi mào gà, đồng thời tiến hành việc phòng tránh lan truyền sẽ giúp giảm nguy cơ các biến chứng dẫn đến hậu quả đến khả năng sinh sản cũng như chất lượng cuộc sống sau này.

7. Chẩn đoán sùi mào gà

Chẩn đoán sùi mào có thể giúp người bị bệnh chủ động nắm bắt được tình trạng bị bệnh của bản thân để kịp thời tiếp nhận một số phác đồ chữa trị khoa học ở giai đoạn sớm, giúp hiệu quả điều trị bệnh được tối ưu. có khả năng chẩn

đoán Bệnh sùi mào gà thông qua một số biểu hiện trên lâm sàng sau:

- Xuất hiện những u nhỏ màu hồng hay màu da, hình thành thành mụn nước hay mọc thành từng nhóm, thường giống như cụm sùi. những u này thường xuất hiện ở vùng nhạy cảm, bao gồm vùng nhạy cảm, hậu môn, môi, miệng cũng như lưỡi, gây ra cảm giác đau đớn, ngứa ngáy hay khó chịu tại vùng có các u, đôi khi có xuất huyết, đặc biệt là lúc chuyển ấy. b.sĩ có khả năng thăm khám bằng mắt thường để phát hiện một số biểu hiện này.
- Sử dụng tinh thể axit axetic: bác sĩ có khả năng dùng tinh thể axit acetic để làm sáng những vùng bị nhiễm sùi mào gà. lúc tiếp xúc với cụm mụn, tinh thể này sẽ biến mụn trở nên trắng sáng, giúp phát hiện

ra nhanh hơn. có thể bôi lên cũng như để trên nhô lên khỏi da từ 2 tới 5 phút, riêng với vùng hậu môn là khoảng 15 phút để tinh thể có thể phát huy lợi ích.

- Lấy mô bệnh phẩm: nếu các kỹ thuật trên không chính xác hoặc chưa đáp ứng, chuyên gia có thể lấy trực tiếp một dòng mô từ những vùng mắc nhiễm sùi mào gà (nốt mụn, u nhú,...) để dẫn vào phòng thí nghiệm, phân tích và xem xét bằng kính hiển vi nhằm xem bên trong các nốt sùi có chứa virus dẫn đến Bệnh sùi mào gà hoặc không? Bệnh đang xấu đi tại giai đoạn nào?.
- Xét nghiệm máu: Xét nghiệm này được áp dụng với một số đối tượng đang nghi ngờ bản thân mắc sùi mào gà nhưng chưa xuất hiện một số biểu hiện chi tiết. mẫu máu của

đối tượng được đem đi xét nghiệm tìm kiếm sự hiện diện của virus HPV.

- Xét nghiệm loại dịch: virút dẫn tới sùi mào gà có thể khu trú trong dịch tiết của người mắc bệnh, chẳng hạn như dịch âm đạo tại nữ giới cũng như dịch lỗ sáo tại nam), cần việc xét nghiệm mẫu dịch có khả năng xác định được tình hình lan truyền cũng như diễn biến của bệnh.
- HPV Cobas – Test: phương pháp này lấy một loại tế bào đã chết tại cổ tử cung nữ giới để thực hiện xét nghiệm tầm soát tế bào ung thư cổ tử cung và thực hiện những xét nghiệm tìm kiếm sự hiện diện của virus HPV cùng một khi. Công nghệ xét nghiệm HPV Cobas – Test có độ nhạy phát hiện bệnh và virus dẫn tới bệnh cực kỳ cao có khả năng lên

tới 90–95%.

- Xét nghiệm PCR xác định type HPV: cách thức chẩn đoán này giúp b.sĩ xác định người bệnh có nhiễm HPV gây ra sùi mào gà hoặc không? nếu có, xác định được HPV dẫn tới bệnh thuộc type nào? Xét nghiệm này được thực hiện qua mẫu bệnh phẩm được lấy từ cổ tử cung, âm đạo hoặc mảnh sinh thiết ở cổ tử cung nữ giới, loại niệu đạo/ dịch niệu đạo ở nam giới.

Nếu phát hiện ra sùi mào gà từ bất kỳ phương pháp nào, chuyên gia sẽ dẫn ra phương án điều trị phù hợp, phụ thuộc vào mức độ cũng như tình hình của bệnh.



Nếu nghi ngờ bản thân bị Bệnh sùi mào gà, nên ngay lập tức tới gặp bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để được chẩn đoán cũng như chữa trị kịp thời.

8. Cách phòng Bệnh lý sùi mào gà

8.1. Tiêm ngừa vắc xin Gardasil/Gardasil 9 để phòng

tránh virus HPV

Vắc xin Gardasil và Gardasil 9 là mẫu vắc xin được dùng để phòng tránh sự tiến công của virus Human Papillomavirus (HPV), dẫn tới các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Vắc xin Gardasil đã được chứng minh là có hiệu quả bảo vệ và đảm bảo tính an toàn sau tiêm cao, đã được áp dụng tiêm chủng dự phòng những chứng bệnh tình dục do HPV dẫn đến trên nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC đang có đầy đủ 2 dòng vắc xin phòng HPV với hiệu quả bảo vệ cao Ngày nay là Gardasil 4 cũng như Gardasil 9. Trong đó, Gardasil 4 là vắc xin tứ giá với chức năng bảo vệ cơ thể khỏi 4 chủng virút HPV thường thấy ở người là HPV 6, 11, 16 cũng như 18.

Vắc xin Gardasil có khả năng phòng những bệnh lý do nhiễm virút HPV như u nhú sinh dục (sùi mào gà, mụn cóc sinh dục), ung thư cổ tử cung, ung thư vòm họng, ung thư tại vùng hậu môn,... được chỉ định dành cho trẻ nhỏ gái cũng như phụ nữ trong độ tuổi từ 9 đến 26 tuổi.

Bên cạnh Gardasil 4, còn có vắc xin Gardasil 9 với hiệu quả và phạm vi bảo vệ vượt trội hơn, có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi sự lây truyền của 9 chủng virus HPV nghiêm trọng cũng như cơ bản nhất Hiện tại là HPV type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58.

do vậy, Gardasil 9 có khả năng phòng bệnh ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, ung thư bộ phận sinh dục nam, ung thư vùng hậu môn, những tổn thương tiền ung thư cũng như loạn sản, mụn cóc sinh dục cũng như bệnh lý do nhiễm virút HPV,... với hiệu quả bảo vệ gần

như tuyệt đối, lên đến 94%. Vắc xin Gardasil 9 được kê toa tiêm chủng cho trẻ nhỏ nam, trẻ nhỏ nữ, thanh niên nam nữ, cộng đồng LGBT, MSM,... từ 9 tới dưới 27 tuổi.

8.2. Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Thăm khám sức khỏe định kỳ là một phương thức cần thiết trong việc đảm bảo sức khỏe tổng thể của mỗi người, đặc biệt là việc phát hiện ra cũng như phòng ngừa bệnh tật. Trong số một số bệnh tật mà kiểm tra sức khỏe định kỳ có khả năng phòng tránh được, sùi mào gà là một trong những bệnh truyền nhiễm tương đối chủ yếu, đặc biệt trong giới trẻ.

Việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ có thể giúp ngăn ngừa được sùi mào gà giúp phát hiện ra nhanh chóng mầm mống dẫn đến bệnh, từ đó chủ động áp

dụng những biện pháp ngăn chặn sự diễn tiến nguy hiểm của bệnh. Theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa, cần thực duy trì thực hiện khám sức khỏe định kỳ đều đặn mỗi 6 tháng 1 lần vì cứ chu kỳ nửa năm, cơ thể người lại bắt đầu tạo ra những thay đổi đáng kể.



Để đảm bảo sức khỏe cũng như phòng ngừa tối đa sùi mào gà, mọi người cần

thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ cũng như tuân theo những giải pháp phòng ngừa đề xuất bởi các chuyên gia y tế.

8.3. Đời sống tình dục lành mạnh

Sinh hoạt tình dục lành mạnh không thể toàn bộ ngăn ngừa được sùi mào gà, nhưng có khả năng giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. Sùi mào gà là một bệnh viêm tại vùng nhạy cảm do virút dẫn tới, gọi là virus HPV (Human Papillomavirus). các giải pháp giúp giảm tỉ lệ mắc Bệnh lý sùi mào gà bằng cách sinh hoạt tình dục lành mạnh bao gồm:

- Sử dụng các giải pháp an toàn khi quan hệ tình dục: sử dụng bao cao su có khả năng giúp giảm tỉ lệ lây truyền HPV trong một số cuộc giao hợp. tuy vậy, BCS không có là giải pháp 100% an toàn, vì chẳng thể

bảo vệ toàn bộ khu vực chưa được che phủ bởi BCS. thêm nữa, cần hạn chế nhiều nhất tình trạng quan hệ nam nữ thông qua con đường miệng.

- Duy trì mối quan hệ hôn nhân chung thủy 1 vợ - 1 chồng, không quan hệ tình dục với nhiều bạn tính, nhất là với các bạn tình chưa được xác định rõ sức đề kháng.

8.4. Bỏ ngay những thói quen xấu

Để phòng ngừa Bệnh sùi mào gà, cần phải từ bỏ những lối sống xấu Dưới đây liền, bởi chúng là một số yêu cầu thúc đẩy cơ thể mắc mắc Bệnh lý sùi mào gà:

- Chuyện phòng the không an toàn: Bệnh lý sùi mào gà được lây nhiễm cơ bản thông qua đường tình dục.

cần chú ý dùng BCS trong quá trình quan hệ và chỉ phải phát sinh chuyện yêu với 1 bạn tình đã thử nghiệm sức khỏe an toàn.

- Chia sẻ vật dụng cá nhân: một số dụng cụ như dao cạo, khăn tắm, quần áo nội y phải sử dụng riêng, không chia sẻ với người khác để tránh tiếp xúc trực tiếp với một số tế bào mắc nhiễm HPV, nguyên do dẫn tới sùi mào gà.
- Thói quen sống kém lành mạnh: hạn chế những cuộc vui, ăn chơi bừa bãi, không hình thành trong môi trường rất nhiều nguy cơ dẫn đến bệnh như quán bar, hộp đêm.
- Sử dụng chất kích thích như hút thuốc cũng như uống rượu bia: Hút thuốc lá cũng như uống quá rất nhiều rượu bia có khả năng làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể, dễ

dòng gây ra những căn bệnh, trong đó có sùi mào gà.

- Thói quen xấu khi vệ sinh cơ thể: cần vệ sinh cơ thể hàng ngày, chăm chỉ thay quần áo, thường xuyên lau rửa vùng kín giúp phòng tránh nguy cơ mắc bệnh lây lan từ tế bào HPV.

9. Những phương pháp chữa trị sùi mào gà

Mặc dù sùi mào gà hầu hết đều triệu chứng thông qua một số triệu chứng là nốt sùi lành tính nhưng bệnh vẫn có khả năng dẫn đến khá nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu nguyên do gây bệnh là các chủng virút HPV thuộc phân nhóm nguy cơ cao gây ra ung thư.

Đối với những hiện tượng bệnh không thể nào chăm sóc đúng cách cũng như

chữa trị kịp thời, sùi mào gà có khả năng phát triển nặng nề hơn, dẫn đến biến dạng ở chỗ (niêm mạc miệng, cơ quan sinh dục, ở vùng hậu môn, vòm họng,...) hoặc phát triển thành ung thư biểu mô tế bào vảy dạng nhú (sùi mào gà khổng lồ), những nốt sần dạng Bowen, loạn sản,...

Thêm nữa, sùi mào gà còn dẫn đến cản trở quá trình sinh nở, gây ra hại cho thai nhi. do vậy, dù nặng hoặc nhẹ, sùi mào gà cần được chú ý chăm sóc đúng cách và tiến hành chữa trị càng nhanh càng tốt. Một vài phương thức điều trị sùi mào gà chủ yếu Hiện nay gồm có:

- Trị liệu bằng thuốc: Có nhiều mẫu thuốc có thể sử dụng để trị liệu sùi mào gà, bao gồm kem bôi thoa, thuốc,.. với công dụng làm khô và làm rụng một số u sùi. các thuốc đặc chữa sùi mào gà cơ bản như

Podophyllin (podofilox), Sinecatechins, Bichloroacetic acid (BCA), Trichloroacetic acid (TCA) nồng độ cao từ 80-90%,... Trong đó, điển hình nhất là podofilox được dùng bên ngoài da với khả năng gây độc chết tế bào gây ra hại ở chỗ, khiến chúng ngừng phân chia, khiến mô bị hoại tử cũng như tự tiêu biến.

- Điều trị bằng liệu pháp đốt điện (Electrocautery): cách thức này sử dụng mẫu điện để làm nóng cũng như nhiệt trị liệu cháy những u sùi, tiêu diệt virút gây ra bệnh.
- Điều trị bằng phẫu thuật: cách thức này được sử dụng để cắt bỏ các khối/ mảng/ cụm/ nốt sùi mào gà tại chỗ. Đây là phương thức phù hợp để áp dụng cho những hiện tượng chưa đáp ứng với những kỹ thuật khác.

- Trị liệu bằng liệu trình lạnh (Cryotherapy): Là phương pháp sử dụng nhiệt độ cực thấp bằng cách xịt nitơ lỏng lên ở vùng mắc tổn thương do sùi mào gà dẫn đến để gây ra đông lạnh, làm hư hại tế bào sùi mào gà, tóm lại làm rụng những u. phương thức này khá an toàn, có khả năng áp dụng để điều trị cho các đối tượng là phụ nữ đang mang thai, tuy vậy phương thức này lại gây ra rất nhiều bất tiện sau lúc thực hiện như có thể dẫn tới hoại tử tế bào, đau đớn, bỏng lạnh, rát, dẫn đến bong nước và để lại sẹo.
- Trị liệu bằng laser CO2 (Vaporization): phương pháp này sử dụng tia laser để nhiệt trị liệu cũng như làm sạch những khối u sùi mào gà.
- Tăng cường/ điều hòa hệ miễn dịch:

Bổ sung vitamin C, E, A, Zinc, Selenium và L-Arginine để tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại HPV cũng như giảm khả năng tái phát sùi mào gà. hoặc dùng những loại thuốc bôi bên ngoài da hoặc dạng tiêm để điều hòa miễn dịch trên một số ở tại vùng thương tổn do sùi mào gà dẫn đến như Interferon, Imiquimod, Sinecatechin, ...

Phải tìm hiểu kỹ về kỹ thuật chữa trị sùi mào gà nào phù hợp nhất với tình hình của mình cũng như tham khảo ý kiến của bác sĩ trước lúc tiến hành chữa trị.

10. Cách chăm sóc người bệnh sùi mào gà

Để chăm sóc bệnh nhân sùi mào gà, có thể tham khảo thực hiện một số giải

pháp sau đây:

- **Đảm bảo vệ sinh cá nhân:** bệnh nhân nên giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ, tắm rửa hàng ngày bằng nước ấm cũng như xà phòng lành tính với da. Tránh sử dụng đồ dùng cá nhân chung như khăn tắm, quần áo với người khác để tránh lây truyền.
- **Điều trị đúng cách:** người mắc bệnh phải tham khảo ý kiến chuyên gia để được chỉ định trị liệu phù hợp. Có nhiều cách thức trị liệu sùi mào gà như đốt điện, điều trị bằng laser, quang động trị liệu, hay dùng thuốc bôi đặc chữa trị,... bệnh nhân nên tuân thủ đúng quy trình chữa trị, không tự ý dùng thuốc hay thay đổi liều lượng.
- **Hạn chế giao hợp tình dục:** người bệnh cần hạn chế chuyện yêu để tránh lan truyền cho đối tác cũng

như tránh làm tổn thương ở tại vùng bệnh. nếu như quan hệ, nên sử dụng BCS hay màng chắn y khoa.

- Giảm stress: Cân bằng đời sống, giữ tâm trạng thoải mái, ăn uống cũng như sinh hoạt đúng giờ giúp cơ thể giảm căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch để chống lại virus.
- Bổ sung dinh dưỡng: Ăn nhiều rau, quả, hạt, chất xơ cũng như protein; tránh thực phẩm giàu con đường, chất béo cũng như đồ ăn nhanh để cải thiện sức khỏe và hỗ trợ chữa trị.
- tư vấn tinh thần: Động viên, an ủi và giúp đỡ người bệnh trong quá trình chữa trị để họ không cho rằng cô đơn hoặc áp lực.
- Theo dõi cũng như kiểm tra: người

bệnh phải tham khảo ý kiến chuyên gia định kỳ trong quá trình điều trị cũng như sau lúc hoàn thành trị liệu để đảm bảo hiệu quả và theo dõi sát sao bất kỳ tác hại nào có khả năng xảy ra, từ đó đưa ra một số cách thức xử lý nhanh chóng.

11. Các thắc mắc hay gặp về sùi mào gà

- Sau khi mắc nhiễm HPV bao lâu thì sùi mào gà xuất hiện?

Trong các trường hợp, sùi mào gà có khả năng tạo ra từ vài tuần tới vài tháng sau lúc tiếp xúc với virút. song, có những người có thể không bao giờ tiến triển sùi mào gà dù đã nhiễm HPV.

Trong các hiện tượng, hệ thống miễn dịch của cơ thể có khả năng tiêu diệt

virút HPV trước lúc nó dẫn tới bất kỳ biểu hiện hay hậu quả nào, trong lúc một số tình trạng khác có khả năng phát triển sùi mào gà cũng như một số biến chứng liên quan.

nếu bạn tự ti về sức đề kháng của mình hoặc nghi ngờ rằng bạn có khả năng đã tiếp xúc với HPV, hãy tham khảo ý kiến của b.sĩ hay bác sĩ chuyên khoa y tế để được thăm khám và tư vấn chữa trị phù hợp.

- Sùi mào gà có khả năng tự khỏi không?

KHÔNG. Hiện nay vẫn chưa có bất kỳ phương pháp hay loại thuốc nào có khả năng chữa trị đặc hiệu Bệnh sùi mào gà. Bởi nguyên nhân chính dẫn tới Bệnh sùi mào gà là một số chủng virút HPV, do đó để điều trị được sùi mào gà, cần phải chữa trị tận gốc sự hiện diện và dẫn tới

hại của những chủng virút này. nhưng tại thời điểm Ngày nay vẫn chưa có phương thức trị liệu dứt điểm HPV, vì thể sùi mào gà chẳng thể tự khỏi nên việc phòng tránh là yếu tố được ưu tiên hiệu quả nhất đối với loại bệnh cực kỳ dai dẳng cũng như khó chịu này.

- Sùi mào gà có để lại sẹo không?

Có thể. Dù bằng cách thức chữa trị nào, sùi mào gà vẫn để lại sẹo, bởi đây là những thương tổn ở cấp độ tế bào, tương đối khó có khả năng lành lại như trạng thái đầu tiên. tuy, vẫn có thể lưu ý các biện pháp sau để giảm thiểu tối đa sự mất thẩm mỹ của sẹo do sùi mào gà để lại gây ra ra:

- Chọn kỹ thuật điều trị phù hợp với tình trạng căn bệnh của bản thân, phải tham khảo ý kiến bác sĩ để dẫn ra quyết định chính xác nhất.

- Sau khi chữa trị, nên chú ý chăm sóc vết thương đúng cách để vết thương mau lành cũng như giảm tỉ lệ để lại sẹo lớn, mất thẩm mỹ.
- Ngừng sử dụng thuốc chữa trị hoặc thay đổi phương thức điều trị theo kê toa của chuyên gia nếu như thấy kết quả không như mong muốn hoặc có một số tác hại không mong muốn xảy ra.

Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nam, Nữ giai đoạn đầu



Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nam, Nữ
giai đoạn đầu, Thuốc trị liệu Sùi Mào Gà
Podophyllin 25 tại nhà



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua ở nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên giải đáp giải thích nhiệt tình đến khi khỏi hẳn.

Kiên trì thực hiện chữa trị cho tới khi sùi mào gà toàn bộ biến mất, để tránh sự tái phát của bệnh cũng như làm tăng khả năng để lại sẹo.

Bệnh lý sùi mào gà không chỉ gây ra các

dấu hiệu sùi lành tính trên nhô lên khỏi da mà còn dẫn đến rất nhiều hậu quả về mặt thẩm mỹ, tâm lý, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, biến dạng vùng kín, sinh ung thư, ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản tại cả nam giới và nữ giới.

Vì thế, đối với Bệnh lý sùi mào gà, phòng tránh là cách đối mặt tốt nhất, giúp cơ thể dự phòng được sự xâm nhập cũng như gây ra hại của virus HPV - nguyên do chính dẫn đến sùi mào gà cũng như các bệnh lây qua con đường tình dục chủ yếu cũng như nghiêm trọng nhất Hiện tại.